

INFORMAZIONI  
PER I GENITORI

# Lesioni della pelle





# Lesioni della pelle

## **Generale:**

Le ferite lacero contuse sono frequenti nei bambini. Possono essere causate da oggetti contundenti, schiacciamento o lacerazione della pelle. L'obiettivo della cura delle ferite è quello di pulire e disinfettare le ferite subite dal paziente e di richiuderle nella maniera migliore possibile, mantenendo la struttura e la funzione della zona della pelle interessata e di evitare l'insorgere di infezioni.

Quasi tutte le ferite lasciano, tuttavia, una cicatrice (rappresentano un'eccezione le ferite molto superficiali e le escoriazioni leggere). In questo caso vi sono molti fattori di grande importanza che non possono essere modificati da parte di una cura delle ferite da parte del medico. Nel caso in cui una ferita sia aperta, grande, sporca o abbia lesionato le strutture sottostanti, è necessario l'intervento del medico per la cura di tale ferita.

## **Infezione:**

Sulla pelle come è noto sono presenti i batteri. In caso di lesione questi batteri possono penetrare all'interno

della ferita e causare una infezione.

Sono particolarmente soggette a rischio di infezione quelle ferite venute a contatto con la saliva animale o umana oppure quelle fortemente sporche. È consigliabile pulire sempre in maniera approfondita tali ferite.

Nonostante la disinfezione è possibile che si manifesti ugualmente un'infezione della ferita, di norma qualche giorno dopo l'avvenuto incidente. I segni di una tale manifestazione sono rossore, dolori e/o gonfiori localizzati nella zona della ferita. Eventualmente è anche possibile la fuoriuscita di pus dalla ferita.

## **Vaccini:**

I batteri del tetano si trovano ovunque e finiscono all'interno del corpo a causa delle ferite e possono azionare un'infezione da tetano nei soggetti non sottoposti a vaccino o vaccinati in maniera insufficiente, fatto che spesso ha conseguenze mortali. Per questa ragione è importante che dopo aver subito una ferita venga controllato il grado di protezione offerto dal vaccino ed eventualmente

procedere ad un rinnovo del vaccino (entro le 24 ore). I pazienti che non sono vaccinati contro il tetano o lo sono in maniera incompleta (meno di 4 vaccini anti tetano) o ancora sono stati sottoposti all'ultimo vaccino anti tetano più di 5 anni fa, devono nuovamente essere vaccinati.

### **Abrasioni:**

Le ferite sono soltanto superficiali ed è sufficiente disinfettare la zona interessata e applicare un bendaggio.

### **Ferite lacero contuse:**

Le ferite lacero contuse devono sempre essere controllate da parte di un medico quando..

- sono più lunghe 1 - 2 cm.
- sono profonde e / o sono particolarmente aperte (i margini della ferita sono diversi mm distanti fra di loro).
- sono sporche (presenza di sporcizia, polvere ecc.).
- si trovano sulla zona del viso.

In genere è sufficiente la disinfezione (ad es. Merfen, Betadine, Octenisept) e l'applicazione di un bendaggio o di steri strip.

### **Trattamento successivo**

Nel caso in cui la ferita del vostro bambino sia stata curata da parte di un medico, quest'ultimo si occuperà di informarvi sulle procedure successive da eseguire. Di norma, nei primi giorni le ferite non devono venire a contatto con liquidi. In caso di ferite chiuse mediante steri strip, questi devono essere rimossi fra i 5 e i 7 giorni successivi e in questo periodo il materiale di bendaggio non deve venire a contatto con liquidi. In caso di ferite suturate o graffate, i fili o le graffe devono essere rimossi fra i 5 e i 14 giorni dopo (in base alla localizzazione della ferita). Rappresentano un'eccezione le ferite suturate mediante filo da sutura riassorbibile.

Tirare i fili il: \_\_\_\_\_

Controllo della ferita il: \_\_\_\_\_

Evitare bagno/doccia/umidità del bendaggio fino al: \_\_\_\_\_

È necessario fare attenzione a proteggere la cicatrice formatasi in seguito a ferita dalla radiazione solare diretta per almeno 6 mesi (creme solari protettive, abbigliamento adeguato).

---

## **Pronto soccorso centro pediatrico Kinderspital di Zurigo**

Servizio di consulenza telefonica a pagamento: 0900 266 71 1



# Quando è consigliabile recarsi dal medico a causa di una ferita?

- Quando la ferita è stata causata dal morso di un animale o di una persona.
- Quando una ferita di apre fortemente, è profonda, è sporca.
- Quando la ferita di trova sul viso.
- Quando il bambino non è più protetto dal vaccino contro il tetano (il soggetto non ha ricevuto finora nessun vaccino contro il tetano o meno di 4 oppure l'ultima somministrazione del vaccino risale a oltre 5 anni prima).
- Quando nella zona della ferita si manifesta dopo qualche giorno arrossamento / gonfiore e il bambino sviluppa inoltre dolore / febbre.
- Quando il bambino, anche giorni dopo l'incidente, lamenta dolori nella zona della ferita.
- Oppure altre ragioni che inducano a preoccupazioni per la salute del vostro bambino.

© Squadra di pronto soccorso, ospedale pediatrico Zurigo ottobre 2009

---